

## PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION DE FORTACIN®

### • Risque de méthémoglobinémie

Il y a un risque de développer une affection diminuant la quantité d'oxygène dans le sang (méthémoglobinémie). Si cela se produit, la peau devient bleu gris en raison d'un manque d'oxygène. **Ne dépassez jamais la dose maximale recommandée.**

### • Risque de réactions cutanées

Si vous ou votre partenaire développez un érythème ou une irritation de la peau, **le traitement par Fortacin® doit être interrompu.** Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

### • Effets indésirables locaux et risque de blessure

Pendant le rapport sexuel, une petite quantité de ce médicament peut être transférée au niveau du vagin ou de l'anus. Un engourdissement ou une anesthésie locale de courte durée peut survenir et diminuer les sensations douloureuses : **faites attention à ne pas vous blesser.** Il en est de même, si une petite quantité de Fortacin® entre en contact avec votre bouche, votre nez, votre gorge ou ceux de votre partenaire.

Pour plus d'informations sur les risques liés à l'utilisation de Fortacin®, consultez la notice.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

L'éjaculation précoce peut être due à une affection nécessitant une surveillance médicale.

Si ce produit est utilisé selon les instructions mais ne délivre pas l'effet attendu, **DEMANDEZ CONSEIL À UN MÉDECIN.**

Y30296 - Février 2023

## INFORMATIONS IMPORTANTES À CONNAITRE AVANT D'UTILISER

**Fortacin®**  
(Lidocaïne/Prilocaine)

FORTACIN® est indiqué dans le traitement de l'éjaculation précoce se produisant **chez l'homme adulte (de 18 ans ou plus)** dès le 1<sup>er</sup> rapport sexuel.

**Avant de prendre ce médicament, vous devez lire attentivement la notice de FORTACIN®** disponible dans la boîte ou sur <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> **et en parler avec votre partenaire.** Vous y trouverez des informations importantes notamment les cas où ce médicament ne doit pas être utilisé (si votre partenaire ou vous êtes allergique à l'un des composants de Fortacin par exemple).

**Vous devez avertir votre partenaire quand vous utilisez FORTACIN®.**  
**Ce feuillet présente les points importants à discuter avec votre partenaire.**

## FORTACIN ET LES PRÉSERVATIFS

**Ne pas utiliser Fortacin® avec des préservatifs féminins et masculins à base de polyuréthane** car une détérioration de ces préservatifs a été observée (ce qui entraîne une réduction de la protection contre les infections sexuellement transmissibles ou un risque de grossesse non désirée). Fortacin® peut être utilisé avec les préservatifs en caoutchouc de latex, polyisoprène, nitrile et silicone.



Caoutchouc de latex



Polyisoprène



Nitrile



Silicone



Polyuréthane

**Vérifiez toujours la composition du préservatif que vous utilisez avant d'utiliser Fortacin®**

## FORTACIN ET GROSSESSE

**Si votre partenaire et vous souhaitez concevoir un enfant :** Fortacin® peut diminuer la possibilité de grossesse. Si ce médicament est indispensable pour la pénétration, laver le gland du pénis le plus soigneusement possible 5 minutes après son application et avant le rapport sexuel.

**Si votre partenaire est enceinte :** Ne pas utiliser Fortacin®.